



DÉFINITION	Maladie virale bénigne s'accompagnant d'une éruption cutanée discrète et diffuse.
SYMPTÔMES	Parfois aucun Fièvre légère, éruption (rougeur) généralisée, Ganglions, douleurs articulaires, conjonctivite, léger écoulement nasal
PÉRIODE D'INCUBATION	14 à 21 jours
PÉRIODE DE CONTAGIOSITÉ	7 jours avant et jusqu'à 7 jours après le début de l'éruption
MODE DE TRANSMISSION	Principalement par contact direct avec les sécrétions du nez et de la gorge des personnes infectées. Par contact avec l'urine de la mère au fœtus au cours de la grossesse.
DURÉE DE LA MALADIE	Environ 7 jours
COMPLICATION	Une infection chez l'enfant né de mère ayant contracté la maladie durant les 20 premières semaines de grossesse peut se manifester par des malformations.
Traitement	Aucun traitement spécifique L'enfant devra être vu par un médecin
PRÉVENTION ET MESURE DE CONTRÔLE	Exclure l'enfant pendant la période de contagion. Surveillez l'apparition des symptômes chez les contacts et diriger vers le médecin, pour évaluation ou vaccination, les femmes enceintes ou les contacts non vaccinés.

¹  CANADA, MINISTÈRE DE LA FAMILLE ET DE L'ENFANCE (2000), *La santé des enfants-en service de garde éducatifs*, Sainte-Foy, Les publications du Québec, 271 pages.