



DÉFINITION	Touche adolescents et jeunes enfants en particulier. Se développe à divers endroit du corps et entrainer des maladies contagieuses. La stomatite ou gingivostomatite est transmise par un virus: le plus souvent, virus de l'herpès HSVI
SYMPTÔMES	Inflammation des muqueuses de la bouche. Peut toucher: gencives langue et palais. S'étend à la gorge et forme une angine herpétique. S'accompagne de symptômes : fièvre, perte d'appétit
MODE DE TRANSMISSION	Elle s'attrape par contagion lors de contact avec une personne porteuse du virus : salive, toux, éternuement, etc. Chez l'enfant, elle peut se manifester après un herpès labial ou buccal .
PÉRIODE DE CONTAGIOSITÉ	Le sujet reste contagieux pendant le traitement
DURÉE DE LA MALADIE	10 à 15 jours
TRAITEMENT	Traiter le virus par un traitement local et oral (antiviraux). Traiter la douleur par administration d'analgésiques.
PRÉVENTION ET MESURE DE CONTROLE	Éviter le contact avec la salive (toux et éternuements) Garder si possible l'enfant à domicile pour éviter la contagion.

LG(2014)

¹  CANADA, MINISTÈRE DE LA FAMILLE ET DE L'ENFANCE (2000), *La santé des enfants-en service de garde éducatifs*, Sainte-Foy, Les publications du Québec, 271 pages.